

Engystol®

Sterile Homeopathic Preparation

DIN-HM 80024618

Composition: 1 ampoule (1.1 ml) contains: **medicinal ingredients:** Sulfur D4 3.3 mg, Sulfur D10 3.3 mg, Vincetoxicum hirundinaria D6 6.6 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 6.6 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 6.6 mg. Source: www.heel.ca. **Non-medicinal ingredients:** purified water, sodium chloride.

Heel Canada Inc.
Montreal, Canada H1J 2Z4
1-888-879-4335
www.heel.ca

Indications: homeopathic preparation to relieve symptoms such as aches and pains, fever, drowsiness and headache often present in cases of colds, influenza and stomach flu.

Contraindications: none known.

Side effects: in individual instances skin rashes may occur after use, in which case discontinue use of the product and consult a health care practitioner.

Interactions with other medication: none known.

Cautions and warnings:

- If fever persists more than 48 hours or if symptoms persist or worsen, consult a health care practitioner.
- Doctor's supervision is recommended before administering to babies (0-2 years).
- Keep out of the reach of children.

Recommended storage conditions: protect from direct sunlight.

Directions: adults, 12 years and older, in general, 1 ampoule (1.1 ml) once daily. In acute cases, 1 ampoule (1.1 ml) up to 3 times daily. Children (6 to 12 years), in general, $\frac{2}{3}$ ampoule (0.7 ml) once daily. In acute cases, $\frac{2}{3}$ ampoule (0.7 ml) up to 3 times daily. Young children (2 to 6 years), in general, $\frac{1}{2}$ ampoule (0.5 ml) once daily. In acute cases, $\frac{1}{2}$ ampoule (0.5 ml) up to 3 times daily. Babies (0 to 2 years), in general, $\frac{1}{3}$ ampoule (0.4 ml) once daily. In acute cases, $\frac{1}{3}$ ampoule (0.4 ml) up to 3 times daily. Otherwise, use as directed by a homeopathic practitioner or physician. Pour in a small quantity of water, sip slowly and keep in mouth before swallowing.

Recommended duration of use: none.

Presentation: packs containing 10 ampoules (1.1 ml each).

Engystol^{MD}

Préparation homéopathique stérile
DIN-HM 80024618

Composition : 1 ampoule (1.1 ml) contient : **ingrédients médicinaux :** Sulfur D4 3.3 mg, Sulfur D10 3.3 mg, Vincetoxicum hirundinaria D6 6.6 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 6.6 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 6.6 mg. **Source :** www.heel.ca. **Ingrédients non médicinaux :** eau purifiée, chlorure de sodium.

Heel Canada Inc.
Montréal, Canada H1J 2Z4
1-888-879-4335
www.heel.ca

Indications : préparation homéopathique pour soulager les symptômes tels que douleurs, courbatures, fièvre, somnolence et maux de tête souvent associés aux cas de rhumes, d'influenza et de gastroentérites.

Contre-indications : aucune répertoriée.

Effets secondaires : dans certains cas individuels des réactions cutanées peuvent survenir après usage. Dans de tels cas, discontinuer l'utilisation du produit et consulter un praticien en soins de santé.

Interactions avec d'autres médicaments : aucune répertoriée.

Précautions et mises en garde :

- Si votre fièvre persiste plus de 48 heures ou si vos symptômes persistent ou s'aggravent, consultez un praticien en soins de santé.
- Le suivi d'un médecin est recommandé avant d'administrer aux bébés (0-2ans).
- Garder hors de la portée des enfants.

Conditions d'entreposage recommandées : protéger de la lumière directe du soleil.

Mode d'emploi : adultes, 12 ans et plus, en général, 1 ampoule (1.1 ml) 1 fois par jour. Dans les cas aigus, 1 ampoule (1.1 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Enfants (6 à 12 ans), en général, $\frac{2}{3}$ ampoule (0.7 ml) 1 fois par jour. Dans les cas aigus, $\frac{2}{3}$ ampoule (0.7 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Jeunes enfants (2 à 6 ans), en général, $\frac{1}{2}$ ampoule (0.5 ml) 1 fois par jour. Dans les cas aigus, $\frac{1}{2}$ ampoule (0.5 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Bébés (0 à 2 ans), en général, $\frac{1}{3}$ ampoule (0.4 ml) 1 fois par jour. Dans les cas aigus, $\frac{1}{3}$ ampoule (0.5 ml) jusqu'à 3 fois par jour. Autrement, utiliser selon l'avis d'un praticien d'homéopathie ou d'un médecin. Verser dans une petite quantité d'eau, boire lentement, garder en bouche avant d'avaler.

Durée d'utilisation recommandée : aucune.

Présentation : emballages de 10 ampoules (1.1 ml chaque).